



Kirurgisk Klinik Vestjylland
Sønderlandsgade 9,2.sal
7500 Holstebro
Tlf. 97 40 40 94

Kikkertundersøgelse af endetarm og nederste del af tyktarmen. (Sigmoideskopi)

Den hyppigste årsag til undersøgelsen er frisk blødning i forbindelse med afføring. Ved undersøgelsen efterses endetarmen og ca. 60 cm af den nederste del af tyktarmen. Der anvendes en bøjelig kikkert, hvor igennem tarmslimhinden kan undersøges, og der kan indføres instrumenter til f.eks. udtagning af vævsprøver eller fjernelse af polypper. For at folde tarmen ud pustes der luft ind, men det meste suges ud igen ved undersøgelsens afslutning. For at undersøgelsen kan gennemføres er det nødvendigt at tarmen udtømmes.

Forberedelse.

De medsendte afføringstabletter Toilax indtages dagen før undersøgelsen, 2 tabletter kl. 8.00 og 2 tabletter kl. 17.

På undersøgelsesdagen.

Du skal ikke faste eller tørste til denne undersøgelse. Et par timer inden undersøgelsen tages vedlagte Toilaxlavement. Man lægger sig på venstre side, sprøjter væsken fra tuben ind i endetarmen, og holder på det så længe som muligt. Efter 10 – 15 min. kommer der afføringstrang, og man tømmer tarmen så godt som muligt.

Undersøgelsen.

Undersøgelsen er kortvarig, ca. 10 – 15 min, og sædvanligvis kun forbundet med lettere ubehag, hvorfor der sjældent er behov for medicin.

Efter undersøgelsen.

Almindelige daglige aktiviteter kan fortsættes.

Komplikationer.

Sigmoideskopi er en sikker undersøgelse, hvor der dog i sjældne tilfælde kan komme blødning eller hul på tarmen, specielt efter polypfjernelse. Skulle der derfor opstå blødning, smerter eller feber skal du undersøges af en læge eller kontakte klinikken.

Yderligere information om klinikken ses på hjemmeside.
www.kir-vest.dk

Med venlig hilsen

Erik Skoubo Kristensen

- Speciallæge i kirurgi og kirurgisk gastroenterologi -